



Tutoria medicina popolare: Gruppo di lavoro corporeo

Choc anafilattico

P. Forster & B. Buser



7-Mär-06

Vedi anche: [Sistema immunitario](#) MmP 15; [Eczemi e neurodermite](#) MmP 9.5; [Pediatria II](#) PD 2; [Fanciulli](#) PD 2.1; [Iperistaminosi](#) MmP 20.2; [Istadelia](#) PTO 4; [Desensibilizzazione allergica](#); [Preparazione Ung. Zinci](#); [Preparati derma- e mucoprotettivi](#)



Lo choc in senso medico è un „crollo circolatorio” dovuto ad uno scompensamento del processo di regolazione circolatorio. Le cause (eventi scatenanti) possono essere diversi: ipovolemia, cardiogeno, sepsis (infettivo, febbre critica), neurogeno o anafilattico (reazione immunitaria allergica). Si entra in una fase di scompensamento (pericolo esistenziale), quando la sistole (mmHg) diventa minore del polso (/min).

Estratto di [Choc](#) MmP 14.4 & [Crollo circolatorio](#) PT 4.4

Fisiologia dello choc




Fig. 1: Fisiologia dello Choc

Lo choc anafilattico può essere una reazione allergica smisurata ad un antigene. Temuto da pazienti allergici (e dai loro medici) per i quali la puntura di un insetto o un'iniezione (specialmente intravenosa) può provocare uno choc anafilattico.

Sintomi

Pochi secondi/minuti dopo il contatto con l'antigene:

- Attacco di sudore.
- Vomito ev. defecazione spontanea.
- Eritema esteso.
- Difficoltà respiratoria.
- Forte prurito del cuoio capelluto e/o della lingua.
- ev. gonfiore

Soccorso

Ambulanza! Nel frattempo mantenere artificialmente il lavoro cardiaco e respiratorio.

Adrenalina per rinforzare la circolazione e calcio/cortisone per "tamponare" la reazione allergica ed eventualmente antistaminici (medico). Se non c'è altro: delle sberle o meglio una forte pressione con l'unghia sul perineo stimolano la produzione adrenalinica endogena!

Se disponibili e usati da chi ha conoscenze in patologia, fino all'arrivo dell'ambulanza possono servire:

- Antistaminico: FENISTIL
- Antiallergico: KALZIUM SANDOZ ff (Novartis)
- Adrenalina: EpiPen (Trimedal) autoiniettore, anche Spray di adrenalina (chiedere al farmacista).
- Per afflitti a questa patologia è consigliabile di portare con se un preparato del genere.
- In forme lievi può anche aiutare la GLYCORAMINA (vit. B3)

Chi ha a che fare con persone allergiche si informi dal farmacista di fiducia riguardo altri prodotti.

Daniela Rüegg & Luigina Janner curavunt

Programma	Corso MmP	Seminari	Conferenze	Lucidi	Dispense	Strumenti
Novità		Forum		Vari	Webmaster	HOME
Scopo	Struttura		Collaboratori	Collegati	Impressum	Amministrazione, Recapiti

Cc by [P. Forster](#) & [B. Buser](#), nd-2.5-it
Except where otherwise noted, this site is licensed under a [Creative Commons Attribution 2.5 License](#).